

Mühdorfer Revital Klinikum prebiotic - 86706

Futter zum Ausgleich bei chronischer Störung der Dickdarmfunktion und bei chronischer Insuffizienz der Dünndarmfunktion.

Analytische bestandteile:

Rohprotein	11 %	Calcium	0,82 %	DE	12,7 MJ/kg
Rohfett	5,3 %	Natrium	0,25 %	Verdauliches Protein	7,85 %
Rohfaser	4,2 %	Phosphor	0,45 %		
Rohasche	4 %	Magnesium	0,34 %		
Zucker	5,3 %				
Stärke	45,1 %				

Zusatzstoffe pro kg:

Vitamin A (3a672a)		9.600 IE	Kupfer (3b405)	Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat	22,5 mg
Vitamin D3 (3a671)		1.500 IE	Klinoptilolith sedimentären Ursprungs (1g568)		1.500 mg
Vitamin E (3a700)	all-rac-alpha-Tocopherylacetat	60 IE	Calciumpropionat (E 282)		990 mg
Vitamin B1 (3a821)		1,5 mg	Kupfer (3b413)		7,5 %
Vitamin B2 (3a825ii)		6 mg	Eisen (3b103)	Eisen(II)-sulfat, Monohydrat	54 mg
Niacinamid (3a315)		24 mg	Eisen (3b108)	Eisen-(II)-Glycinchelate-Hydrat	6 mg
Vitamin B6 (3a831)		4,5 mg	Mangan (3b502)	Manganoxid	80,1 mg
D-Biotin (Vitamin B8) (3a880)		30 mcg	Mangan (3b506)	Glycin-Manganchelat-Hydrat	9,9 mg
Folsäure (Vitamin B11) (3a316)		3 mg	Zink (3b603)	Zinkoxid	104,4 mg
Vitamin C (3a300)		60 mg	Zink (3b607)	Glycin-Zinkchelate-Hydrat (fest)	15,6 mg
Cholin (3a890)		60 mg	Selen (Natriumselenit)		0,56 mg
Vitamin B12 (Vitamine B12)		24 mcg	Selen (3060)		0,05 mg
			Jod (Calciumjodat)		1,2 mg
			Calcium (3a841)	Calcium-D-Pantothenat	9 mg
			Molybdän (E7)	Natriummolybdat	0,3 mg

Zusammensetzung: Gerste (getoastet, gerollt) 42 % / Gepuffter Mais NGMO 37 % / 7 % / Topinambur (fermentiert) 5 % / Schwarze Sonnenblumenkerne 2 % / Rohrmelasse 1,5 % / Leinsamen 1,5 % / Calciumcarbonat 1,62 % / Feuchte Getreideschlempe 0,6 % / Bierhefe 0,4 % / Natriumchlorid (salz) 0,24 %

Haltbarkeit: 6 Monate

Lagerungshinweis: Kühl, trocken und dunkel lagern. Die Verpackung nach Gebrauch wieder verschließen

Fütterungsempfehlung:

1–3 kg verteilt auf mindestens 2 oder mehr Rationen pro Tag, je nach Raufutterqualität über einen Zeitraum von mindestens 6–8 Wochen. Auch zur dauerhaften Fütterung sehr gut geeignet. Dieses Ergänzungsfuttermittel darf wegen der gegenüber Alleinfuttermitteln höheren Gehalte an Vitaminen und Spurenelementen nur nach den hier angegebenen Fütterungsempfehlungen verfüttert werden. Es wird empfohlen, vor der Verfütterung oder Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen.

20 kg